

## Neolamprologus falcicula (Brichard, 1989).

С. Аникштейн

[www.tanganyika.ru](http://www.tanganyika.ru)

(опубликовано 27.06.2006 / dvan)



Неолампрологусы - немного науки... Название рода происходит из-за блестящих боков тела. Впервые описание рода было опубликовано в *Revue francaise des Cichlidophiles*. Эндемик озера Танганьика. Введен Колумбом (Colombe) и Оллгайером (Allgayer), которые пересмотрели, род *Lamprologus* и обнаружили различия в строении черепной и супраорбитальной костях. Род долгое время не существовал, пока Полл (Poll) в 1986, не предпринял очередной пересмотр. Фактически он подтвердил существование рода *Neolamprologus*. В состав рода входят только эндемичные для озера Танганьика виды.

Видовое название рыбы, о которой пойдет речь в этой статье возникло от латинского слова *falcis* - [сerp, крюк] из-за серповидной формы хвостового плавника. Типовой экземпляр был обнаружен в районе Магара (Magara), Бурунди. На глубине 10 м. *Neolamprologus falcicula* встречается у побережья Танзании в районах мыса Мпимбве, в Кигома (Kigoma), в Кипили (Kipili), Фулве (Fulwe), Нкондве (Nkondwe) и т.д..

После многих лет работы в Местечке Магара (Magara) в Бурунди, Бришар (Brichard) установил, что *Neolamprologus falcicula* обитает на глубинах более чем 15 метров. Живет парами или в очень маленьких группах, обычно в непосредственной близости к большим стаям *N. brichardi*. Наиболее важная особенность отличающая *N. falcicula* от *N. brichardi*, помимо окраски состоит в отсутствии рисунка на жаберных крышках. Э. Конингс в своей статье «Комплекс *Neolamprologus brichardi*» отмечает, что цихлида с торговым названием *Neolamprologus* sp. "Walteri", найденная в заливе Кигома (Kigoma Bay) и у мыса Кабого (Cape Kabogo), является скорее всего географической разновидностью *N. falcicula*. Сегодня известна и еще одна геовариация этого вида, под названием *Neolamprologus* sp. "Cygnus", которая была обнаружена у мыса Мпимбве (Cape Mpiringwe) в Танзании

(A.Konings, Cichlid Yearbook vol. 1). *N. falcicula* никогда не был замечен в больших группах, кроме пожалуй случая с обнаружением больших скоплений расы *Neolamprologus* sp. "Walteri" в заливе Кигома (Kigoma Bay).

Места обитания этого вида в основном скалистая прибрежная зона на глубине от 10 до 30м. *N. falcicula* предпочитает участки с выходом на песчаный субстрат. Этот вид не встречается большими группами(как уже говорилось выше) и обычно плавает в одиночку. Таким образом *Neolamprologus falcicula* вероятно ближе связан с *Neolamprologus savoryi* по образу обитания. Особи различных рас *N. falcicula* - отличаются отсутствием узора на жабрах в принципе и черными внешними гранями спинных и анальных плавников.



*Neolamprologus falcicula* некрупный вид, достигает 8 см в длину, самки мельче. Тело вытянуто и уплощено с боков. Имеет отчетливо разветвленный хвостовой плавник, спинной и грудные плавники вытянуты. На теле и жаберных крышках нет никакого рисунка. Мальки и подростки выглядят довольно симпатично, особенно приятно цветовые сочетания в области хвоста и головы, в виде ярких оранжево-желтых пятен. Пожалуй это единственная рыба из «Комплекса Принцесс» у которой такой яркий малек. У взрослых особей тонкие косицы хвостового и грудных плавников бело-голубого цвета, глаза также привлекают внимание бирюзовым блеском. Половой диморфизм отсутствует. За исключением размера и формы генитальной папиллы, которая у самок побольше и имеет округлую форму. Однако наблюдательному аквариумисту наверняка удастся отличить самку от самца по поведению, особенно при нересте или во время преднерестовой ситуации

Рацион этого вида в природных условиях составляют как правило различные мелкие ракообразные, личинки насекомых, планктон.

Аквариум для содержания *Neolamprologus falcicula* должен иметь объем не менее 100-150л на пару, состоять из завалов крупных камней и иметь достаточно укрытий в виде пещер и расщелин. Для этих целей можно использовать также цветочные горшки с отверстиями, различные керамические гроты или «щелевой кирпич». Субстрат должен состоять из мелкого речного песка. Для одной пары достаточно аквариума с площадью 50х50см. Для получения удачной семьи можно завести группу подростков этих неолампрологусов и позволить им разделиться на пары. В качестве корма можно использовать артемию, циклоп, мясо креветки, дафнию или другие живые и

замороженные корма. Можно содержать совместно с другими цихлидами озера при наличии адекватного объема и количества укрытий. Важно создать ниши для различных разновидностей. Однако, стоит помнить что этот вид становится агрессивным в период нереста. При освещении аквариума с *Neolamprologus falcicula* я использую лампы "Power Glo" от Hagen они делают окраску рыб наиболее привлекательной, особенно улучшается зрительный эффект в отношении окраски неоновых «косиц» и глаз рыб.



Внутривидовая агрессия у представителей *N. falcicula* довольно сильная. Нестабильно разводится в неволе, поскольку пары не всегда формируются. Не рекомендуется содержать вместе с видами входящими в комплекс "*brichardi-pulcher*", во избежание гибридизации. Нерестятся на субстрате, например крае скалы, плоском камне. При 26С, выклев личинок происходит приблизительно через 2.5-3 дня, а плавать свободно мальки начинают еще через 5-6 дней. С первых дней мальки охотно поедают науплии артемии и мелкого циклопа. В начале мальки остаются поблизости от нерестовой площадки, но по достижении размера 2-3 см отгоняются родителями