

Расбора клинопятнистая.

Rasbora heteromorpha



Клиновидная расбора, клинопятнистая расбора, расбора арлекин

Название Расбора гетероморфа

Латинское название *Rasbora heteromorpha*

Другое имя Клиновидная расбора, клинопятнистая расбора, расбора арлекин

Отряд Карпообразные (Cypriniformes)

Семейство Карповые (Cyprinidae)

Ареал обитания Ручьи и реки. Малайский п-ов, Таиланд, Суматра



кН

рН 6.00 - 7.50

gН 9.00 - 18.00

Температура 22.00 - 26.00

Объем аквариума 50

Размер до 4.50

Способ размножения Икромечущие

Совместимость Мирная

Хищная Нет

Стайная Да

Слой обитания средний

Отношение к растениям Растения необходимы

Неприхотливая, яркая, мирная аквариумная рыбка, рекомендуется для начинающих аквариумистов.

Отличительной чертой клинопятнистой расборы является сине-черное треугольное пятно на боку задней половины тела, тянущееся до конца хвостового стебля. Окраска тела серебристая внизу, переходящая в оливково-зеленоватую к верху, на спинном плавнике красно-оранжевое пятно. Хвостовой плавник глубоко вырезанный. Грудные и анальные плавники (кроме одного) прозрачны. На непрозрачном имеются черные штрихи.

Эти аквариумные рыбки так же отличаются глазами большого размера, по сравнению с размерами тела. Глаза черные с красно-желтым ободком.

У взрослых самцов пятно с более прямым передним краем и более заостренным задним углом достигающим до края брюшка. У самок более полное брюшко и нижняя часть треугольника не заострена и доходит только до половины тела.

Расбор лучше содержать группами не менее 8 особей. Особенно привлекательно выглядит при содержании стайкой от 10 штук в аквариуме с темным грунтом и криптокоринами разных видов.

Аквариум для содержания не менее 50 л, засаженный растениями, со свободным местом для плавания. Предпочитает старую воду с добавлением торфяного экстракта, желательны фильтрация и умеренные подмены воды.

Корм – соразмерный живой, сухой или мороженный.

Половозрелости достигают в 8-10 месяцев.

Самки обычно созревают раньше самцов, по этой причине первые нересты могут быть неудачными. Для размножения лучше всего выбирать производителей не старше 2 лет.

Нерест как парный, так и групповой. Желательно предварительно в течении одной-двух недель подержать производителей отдельно.

Для пары можно использовать нерестовик 3-5 литров, для группового размножения - 40-50 литров.

Нерестовик для группового нереста должен быть густо засажен растениями, а уровень воды в нем - не более 20 см, на дне – сепараторная сетка, так как рыбки охотно поедают свою икру. Освещение умеренное. Температура 26-28°С, gH 4-6.5°, pH 6,5. В воду необходимо добавить торфяной экстракт (или экстракт из ольховых соплодий) до приобретения янтарного цвета.

При парном нересте самки мечут икру на нижнюю часть широколиственных растений (криптокорин, тайландского папоротника и др.), которую оплодотворяет самец после брачного танца.

Плодовитость самок – до 300 икринок. После нереста производителей отсаживают. Личинки выходят через 1-1,5 суток, а еще через пять дней плывут. Стартовый корм – инфузории, коловратка, науплии артемии и циклопа, можно их выкармливать и сухим кормом. Мальки относительно крупные и быстро растут. В возрасте одного месяца у них уже появляется треугольник.

Известна черная цветовая вариация.

При содержании в грязной воде подвержены бактериальным инфекциям.