

Меланотения Боэсмана
Melanotaenia boesemani



Размер до 10 сантиметров
Температура: 22–25 °C
Жёсткость воды: 7–25°
Кислотность воды: 7.0–8.0 pH

Родина рыбки – Новая Гвинея

Описание

Длина тела меланотении Боэсмана до 10 см. Рыбка имеет высокое, овальное туловище,

сплющенное с боков. Спина вогнутая, голова узкая. Окраска тела зависит от условий содержания и самочувствия рыбки. В стрессовой ситуации окраска тела сине-серая. При хороших условиях существования и правильном кормлении рыбка приобретает красивую окраску. Передняя половина тела самца (от головы до середины туловища) тёмно-синей, либо фиолетовой окраски. Задняя часть тела (от середины туловища до кончика хвоста) огненно-красного цвета с жёлтым или оранжевым отливом. Плавники жёлтые с белой каймой. Самки отличаются от самцов сплошной темно-синей окраской тела, менее интенсивной с заметным серебристым блеском. Нередко бывает, что самки имитируют расцветку самцов, однако плавники у них гораздо меньше, а тело более узкое.



Содержание

Радужницы Боэсмана - стайные, мирные рыбки. Лишь во время брачных игр самцы могут устраивать поединки между собой. Предпочитают держаться в верхнем и среднем слое воды, на открытом участке. Для их содержания годится аквариум длиной 80 см и более, объемом 150 литров и более, с зарослями растений и свободным местом для плавания, ярким освещением. Вода должна быть чистой, фильтроваться, снабжаться кислородом, а также следует проводить подмену до 40% объёма воды раз в неделю. В соседи следует подбирать таких же по размерам, спокойных рыбок, а лучше всего представителей радужниц других видов. Кормить меланотению Боэсмана можно любым

кормом, но лучше всего живым кормом (дафния, коретра, артемия, трубочник, мотыль) или сочетанием хорошего сухого и мороженного корма.

Разведение

На нерест можно сажать пару радужниц Боэсмана или группу рыбок с большим числом самок. За 1-2 недели до нереста производителей держат отдельно и интенсивно кормят.

Нерестовик объёмом 30 литров более для пары, грунт не нужен, требуются кусты мелколистных растений, освещение верхнее. Некоторые аквариумисты рекомендуют переднее стекло нерестовика затемнять, оставляя обзор лишь по бокам. Параметры воды для разведения: температура 24 °C, жёсткость 5-7°, кислотность 6,5 — 9. Нерест происходит порционно, до 50 икринок ежедневно на протяжении 7 дней. Рыбки не трогают икру и мальков. Субстрат с икрой чаще всего переносят в отдельный инкубатор, уровень воды к которому будет до 15 см. Инкубация икры 5 — 7 дней, а ещё через несколько часок мальки уже могут плавать. Кормить мальков следует живой пылью. Рост мальков медленный. В период роста мальков нужна слабая фильтрация. Половая зрелость у меланотении Боэсмана наступает в 8-10 месяцев.