Карликовый тетрадон - Carinotetraodon travancoricus

Карликовые тетрадоны – забавные, милые создания. Обитают они на Юге Индии в штате Керала в системе каналов и озер с песчаным или илистым грунтом. Carinotetraodon travancoricus относятся к исключительно пресноводным видам и никогда не заплывают в морскую воду и подсаливать воду для них не нужно!!!

Оформление аквариума для них большого значения не имеет. Но всё же карликовые тетрадоны замечательно себя чувствуют в густозасаженных аквариумах, украшенных извитыми корягами и ветками, которые служат им дополнительной защитой (среди которых они могут прятаться). Аквариум, оформленный таким образом, обеспечит широкое поле деятельности для этих любознательных рыбок и уменьшит внутривидовую агрессию. Можно также использовать плавающие растения для рассеивания света. В

таких условиях, как правило, эти рыбки более активны. Поток воды в аквариуме необходимо сделать средней мощности, так как этот тетрадон в природе обитает в спокойной воде. Важны регулярные частичные подмены воды.

Вы можете содержать 2-3 тетрадончика в аквариуме объёмом 10 литров. Для стайки из 5-6 особей потребуется аквариум от 20 литров.

Карликовый тетрадончик, как и другие четырёхзубые, охотится на улиток, моллюсков, червей. Кушает живые и замороженные корма. Им необходимо время от времени давать в качестве корма небольших улиток в ракушке, для того чтобы они могли стирать постоянно растущие зубки. Сухие корма они едят с неохотой.

Не смотря на небольшой размер, карликовые тетрадоны будут бороться за еду с более активными и энергичными рыбами и легко могут отвоевать её у более крупных товарищей. Хорошо уживаются с крупными подвижными, не агрессивными рыбками других видов и взрослыми креветками. Для них хорошо подходят отоцинклюсы, расбора

Эспей, Данио Хопра, Радужницы и др. Успешно совместное проживание с креветками Амано, Черри и некоторыми другими видами пресноводных креветок, которые стали очень популярны в последние годы.

Рыбки-шарики могут раздувать свои упругие животики, наполняя их водой или воздухом. Как правило, это ответ на какую-либо угрозу, хотя в аквариуме многие из них могут надуть себя без всякой видимой на то причины. Рыбка увеличивается в два или три раза в размере и этого достаточно, чтобы отпугнуть многих потенциальных хищников или чтобы её было трудно проглотить. Карликовые тетрадончики также являются одними из немногих рыб, которые действительно могут поворачивать глаза.

У Карликовых тетродонов – особая манера охоты. Тетрадончик зависает над целью, внимательно рассматривает объект (улитку), выбирает момент и только потом ее атакует. Этот процесс у него достаточно длительный! Для него существует небольшая зона вокруг цели, составляющая около 5 см в диаметре, в пределах которой он принимает решение на атаку. Бывает, что даже коретра умудряется сбежать (отскочить) от него и ему приходится опять прицеливаться.

Карликовые тетрадончики привержены к распорядку дня. Просыпаются рыбки с рассветом или при включении освещения. Размяв немного плавнички, они строятся возле переднего стекла и выглядывают хозяина, который их покормит. После трапезы расплываются по аквариуму, и опять все успокаиваются. Некоторые рыбки снова дремлют с полными животиками. Подростки уже с утреннего времени начинают дурачится.

Взрослые тетрадончики во второй половине дня начинают интересоваться друг другом. Самцы набирают более темную, желтую окраску и начинают возбужденно плавать вокруг пучка мха, в ожидании самочки и отпугивая соперников. Нерестовое оживление длится часов до 7 вечера, а в 8 – не обращая внимания на освещение, Карликовые тетрадончики дружно устраиваются на ночлег.

Карликовые тетраодоны очень умные и смышлёные рыбки-интеллектуалы. При появлении хозяина возле аквариума проголодавшиеся рыбки начинают выпрашивать корм, при этом самочки более откровенные, выпячивают глазки и активно плавают вдоль стекла, а самцы скромнее - они себе спокойно плавают и ждут-дожидаются. За день они нагуливают хороший аппетит и вечером всей толпой дожидаются банкета.

Размножение:
В отличие от многих своих родственников, Каринотетрадонов траванкорикусов успешно разводят в аквариумах. Чаще всего для нереста берут пару рыбок или группу: одного самца и нескольких самочек. Большее количество самочек также снижает риск чрезмерного преследованиям со стороны любвеобильных самцов. Успешно размножение происходит также в больших группах рыб, состоящих из нескольких представителей каждого пола.

Если в аквариуме только пара-тройка Карликовых тетрадончиков, то он не должен быть

особенно велик. Можно установить небольшой фильтр, но это вовсе не обязательно, главное регулярно проводить небольшие подмены воды. В аквариуме среди растений должны преобладать тонколистные растения, такие как Cabomba, Ambulia, яванский мох,Vesicularia или Willow Moss (Fontinalis antipyretica). Они предпочтительнее всего для нереста этих рыбок. Параметры воды должны быть оптимальными (закладка Характеристики), температуру следует установить в пределах верхней границы диапазона.

В качестве корма используют трубочник и мороженые корма, такие как мотыль и множество небольших улиток. Когда самец готов к нересту, его цвет и рисунок становиться несколько интенсивнее, а тело уплощается с боков и приобретает менее округлую форму.

Ухаживания начинается с того, что самец энергично преследует самку, часто прибегая к кусанию и покалыванию её, если она не проявляет интерес. Успешная погоня обычно заканчивается тем, что самку загоняет на участок с низкой растительностью, где они вместе с самцом одновременно в течение нескольких секунд выпускают икринки и молоки. Почти прозрачные икринки – совсем крошечные (около1 ммв диаметре) без клея, развиваются там, где они упали. Нерест может повторяться несколько раз, пока самка не отметает всю икру. Количество икринок может сильно варьироваться (до 100 штук), но у тетрадончиков есть особенность – они часто поедают свою икру, потому после нереста их следует убрать или переместить икру в более контролируемые условия, где будет гораздо проще наблюдать за её развитием. Икринки могут быть удалены с помощью большой пипетки.

Аквариум в котором подрастают мальки должен быть обустроен с использованием воды из родительского аквариума и поддерживаться при той же температуре. Лучше всего использовать простой аэрлифтный фильтр, так как любознательные мальки не будут втягиваться в него, а полезные для мальков микроорганизмы будут расти на его поверхности и мальки смогут пастись на нём. Кроме того рекомендуется добавить дополнительно несколько прядей мха из нерестовых ёмкостей. Обязательно нужно удалить все бесплодные или зараженные грибком икринки (молочно-белого цвета).

Личинки вылупляются из икры приблизительно на 5-6 день, мальки еще 2 - 3 дня будут питаться желточным мешком, после чего они становятся более активными. Первоначальный корм должен быть очень мелким. Это могут быть подвижные беспозвоночные, такие как микрочерви (гриндаль). Приблизительно через неделю мальки, как правило, достаточно большие, чтобы принять науплию артемии, а через месяц обычно могут быть переведены на более крупный корм, такой как замороженный мотыль. Мальков разных возрастов следует содержать раздельно, так как более крупные из них могут охотиться на своих более миниатюрных братьев и сестер.